

OrbeSeal® succesvol gebruiken

Tijdens het droogzetten is het belangrijk om hygiënisch te werken, zo voorkomt u overdracht van mastitisinfecties. Draag nieuwe wegwerphandschoenen tijdens het droogzetten. Bewaar OrbeSeal bij kamertemperatuur (15 tot 30°C).

ORBESEAL PAST IN IEDERE DROOGZETSTRATEGIE, OOK IN COMBINATIE MET EEN ANTIBIOTICUMHOUDENDE DROOGZETTER. UW DIERENARTS ADVISEERT U GRAAG.



1 Melk uw droog te zetten koe(n) als eerste dan wel als laatste, dat voorkomt onrust in de melkstal. Zorg dat alle spenen goed schoon en droog zijn. Gebruik altijd een nieuw paar handschoenen.



2 Ontsmet het slotgat van iedere speen met een nieuw desinfectiedoekje. Als het slotgat weer droog is, dient u indien noodzakelijk als eerste de antibioticumhoudende droogzetter toe en daarna de OrbeSeal-injector.



3 U werkt het meest effectief door het toedienen van de injectoren per speen af te werken. Houd de volgorde aan, zoals aangegeven op de foto.



4 De OrbeSeal-injector bevat door het productieproces wat lucht. Om de injector te ontluchten zonder het dopje van de injectorpunt te verwijderen, knijpt u de injector in het midden voorzichtig in. Druk tegelijkertijd de zuiger rustig aan totdat u weerstand voelt: de lucht ontsnapt nu langs de achterkant van de zuiger.



5 Breng de punt van de OrbeSeal-injector in het tepelkanaal, terwijl u de speen bij de basis (vlak bij de uier) met twee vingers dicht knijpt, en breng de inhoud **langzaam** in. Gebruik één injector per kwartier. Masseer OrbeSeal niet naar boven, OrbeSeal moet in het tepelkanaal blijven om effectief te zijn.



6 Markeer de koe na het inbrengen van OrbeSeal, zodat anderen kunnen zien dat ze drooggezet is. Dip daarna elke speen met een geregistreerd dipmiddel.

ZO VERWIJDEERT U ORBESEAL NA DE DROOGSTAND:



1 Om OrbeSeal effectief te verwijderen, melkt u na afkalven de eerste 10 stralen stevig, handmatig uit.



2 Melk de eerste stralen in een emmertje of op een papieren doekje, zodat u de restjes OrbeSeal gemakkelijk kunt weggooien.



3 Melk de verse koe vervolgens gewoon zoals u gewend bent.



Bekijkt u liever een video-instructie?



ontluchtingstip



enkeltherapie



dubbeltherapie

Ontluchtingstip: <http://goo.gl/MME3nw>

Enkeltherapie: <http://goo.gl/mp3JNY>

Dubbeltherapie: <http://goo.gl/pAu9P8>



OrbeSeal

OrbeSeal®, Suspensie voor intramammaire toediening bij het rund (melkkoeien) bij droogzetten. •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – REG NL 10082 –UDA. •**Werkzaam bestanddeel**: Elke injector bevat 4 g pasta welke 65% bismuth subnitraat bevat, in een minerale olie als drager. •**Doel**: Rond (melkkoeien). •**Indicaties**: Preventie van nieuwe intramammaire infecties gedurende de gehele droogstandperiode. Bij koeien die beschouwd worden als zijnde vrij van subklinische mastitis kan OrbeSeal op zichzelf gebruikt worden voor droogzetmanagement en mastitiscontrole. Selectie van de koeien voor behandeling met OrbeSeal dient gebaseerd te zijn op veterinaire klinische beoordeling. Selectiecriteria kunnen gebaseerd zijn op het mastitis- en celgetal-verleden van de individuele koeien of erkende testen voor het aantonen van subklinische mastitis of bacteriologische monsternamen. Zie bijsluiter. •**Dosering en toedieningswijze**: Dosering: Breng de inhoud van één injector OrbeSeal in de speen van elk kwartier in, direct na de laatste melkbeurt van de lactatieperiode (bij het droogzetten). Speen of uier na het inbrengen van het product niet masseren. Toediening: Uitsluitend voor intramammaire toediening. Er dient voor gezorgd te worden dat er geen pathogenen ingebracht worden in de speen. Daar OrbeSeal geen antimicrobiële werking heeft, is het essentieel dat er bij het inbrengen een strikt aseptische techniek toegepast wordt. Lees vóór gebruik de bijsluiter. •**Contra-indicaties**: Gebruik niet alleen dit product bij koeien met subklinische mastitis op het moment van droogzetten. Niet gebruiken bij koeien met klinische mastitis op het moment van droogzetten. Niet gebruiken bij lacterende koeien. Indien per ongeluk ingebracht bij een lacterende koe, kan er een kleine (tot tweevoudige) tijdelijke verhoging van het celgetal waargenomen worden, maar de seal kan er handmatig uitgestript worden en er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Pas geen ander intramammair product toe ná de toepassing van OrbeSeal. •**Wachtermijn(en)**: (Orgaan)vlees en melk: nul dagen. •**Bijwerkingen**: Geen bekend. •**Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen**: Zie bijsluiter. •**Nadere informatie**: Zie verpakking/bijsluiter of op aanvraag beschikbaar bij de registratiehouder: Zoetis B.V.-Postbus 81055-3009 GB Rotterdam-Nederland (e-mail: info.nl@zoetis.com).